



中華人民共和國香港特別行政區政府總部教育局
Education Bureau
Government Secretariat, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
The People's Republic of China

本局檔號 Our Ref.: (115) in EDB(COA)ADM/60/1/1(5)

電話 Telephone:

來函檔號 Your Ref.:

傳真 Fax Line:

致：全港學校校監/校長

各位校監/校長：

提高警覺 預防猩紅熱

根據衛生署衛生防護中心的最新資料，香港猩紅熱的活躍程度正處於高水平。本局謹此促請各學校提高警覺，預防猩紅熱及其他傳染病在校園傳播。現隨函夾附由衛生署衛生防護中心於本年六月二十二日發出的有關信件，供學校參閱。學校應參照信中所載的建議，落實各項衛生及預防猩紅熱的措施，並應提醒家長如發現子女有患上猩紅熱的徵狀，應立即向醫生求診及按照醫生建議讓子女留在家中休息。

如學校有懷疑猩紅熱或其他傳染病爆發，應立即填妥「懷疑學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心內集體感染傳染病」呈報表格，盡早向衛生署中央呈報辦公室呈報（傳真：2477 2770；電話：2477 2772），以便該辦公室及早進行流行病學調查及防控措施，學校亦須將有關呈報表格副本傳真至所屬的區域教育服務處/學前服務聯合辦事處。

此外，衛生防護中心由六月二十一日開始於其網頁公布猩紅熱每日概覽。學校可循以下網頁路徑查看有關情況：

衛生防護中心(www.chp.gov.hk) > 預防猩紅熱 > 最新數字^{更新}

本局亦再次提醒各學校於考試期間或舉辦試後課外活動及暑期活動時，須保持警覺，做好各項防禦工作，以減低學童受猩紅熱或其他傳染病感染的機會。學校於暑假期間亦應徹底清洗和消毒校園，以預防各類傳染病在校園散播。學校可循以下網頁路徑，瀏覽衛生防護中心發出的「學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引」，採取適切的措施：

教育局主頁(www.edb.gov.hk) > 學校行政 > 一般行政 > 預防流感及其他傳染病 > 1. 預防人類豬型流感 > 指引

本局會繼續與衛生防護中心保持緊密聯繫，並把有關猩紅熱及其他傳染病的最新資訊通知學校。如有任何查詢，請與所屬的高級學校發展主任或學前服務主任聯絡。

教育局局長

(李煜輝  代行)

二零一一年六月二十三日

監測及流行病學處



Surveillance
And
Epidemiology
Branch

本署檔號 Our Ref.: (11) in in DH SEB CD/8/50/1

各位校長/ 主任/ 老師:

提防猩紅熱

繼六月九日提醒各位有關猩紅熱個案上升的信件，衛生防護中心現特函通知貴校有關猩紅熱的最新情況。最新數據顯示現時香港猩紅熱的活躍程度正處於高水平。

在二零一一年內（截至六月二十一日），衛生防護中心共錄得466宗猩紅熱的個案，至今個案已超越過去十年每年總數。個案年齡由一個月至37歲（中位數：6歲），當大約百分之九十二的染病兒童年齡少於十歲。截至目前為止，本中心在二零一一年內（截至六月二十一日）共錄得八宗院舍爆發，當中包括四宗在幼稚園 / 幼兒中心發生，三宗在小學發生及另一宗在特殊幼兒中心發生，共影響26人，而每宗爆發則涉及二至七人。此外，本中心在二零一一年共錄得兩宗死亡個案，分別為一名五歲男童及一名七歲女童，該名五歲男童離世前所就讀的學校同時呈報一宗水痘爆發的個案，本中心因此建議該校停課一週。

猩紅熱是一種由甲類鏈球菌引致的傳染病，服用合適的抗生素可有效治療猩紅熱。如懷疑患上猩紅熱，應立即向醫生求診，並根據醫生指示服用抗生素。

猩紅熱的徵狀通常為發燒、咽喉痛及出疹。皮疹會在發病首天或翌日在軀幹或頸部出現，接着蔓延至四肢，特別是腋窩、肘部及腹股溝。該種皮疹的特點是患處皮膚粗糙。皮疹會在一星期後消退，手掌和腳底繼而會脫皮。隨猩紅熱併發的病症，有時還包括心臟病、腎病以及較罕見的中毒性休克綜合症。

患者通常透過呼吸或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而傳播，潛伏期大約為一至三日。本中心現籲請各位要確保學校內有足夠的預防措施，防止猩紅熱在貴校傳播。要預防猩紅熱，請注意以下措施：



衛生防護中心乃衛生署
轄下執行疾病預防
及控制的專業架構
The Centre for Health
Protection is a
professional arm of the
Department of Health for
disease prevention and
control

- 兒童若發現有發燒、咽喉痛及出疹，應向醫生求診。患者不應上學或返回學校/幼兒中心，直至完全康復為止，或跟隨醫生指示回校上課。
- 維持良好的個人及環境衛生。
- 保持雙手清潔，並用正確方法洗手。
- 雙手被呼吸系統分泌物弄污後(如打噴嚏後)應立即洗手。
- 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物。

香港九龍亞皆老街 147C 號 3 樓
3/F, 147C Argyle Street, Kowloon, Hong Kong

● 保持空氣流通。

如察覺學生及職員出現兩個或以上猩紅熱個案，請盡早通知衛生防護中心(傳真號碼：2477 2770，電話號碼：2477 2772)。我們會就如何處理這些個案提供指引，並採取適當控制措施。在特殊情況下，本中心會根據流行病學的評估結果(爆發的規模、出現死亡個案等)，建議個別受猩紅熱影響的學校停課。

衛生防護中心將由六月二十一日開始於本中心網頁公布猩紅熱每日概覽。如欲取得更多資料，可瀏覽衛生防護中心網站(網址為 <http://www.chp.gov.hk>)。

衛生署衛生防護中心總監

(黃宏



醫生代行)

二零一一年六月二十二日



衛生防護中心乃衛生署
轄下執行疾病預防
及控制的專業架構
The Centre for Health
Protection is a
professional arm of the
Department of Health for
disease prevention and
control

香港九龍亞答街 147C 號 3 樓
3/F, 147C Argyle Street, Kowloon, Hong Kong